

回	テ　ー　マ	授　業　の　内　容	予習・復習	到達目標番号*
1	界面活性剤のミセル形成	表面張力の特性を利用して界面活性剤の臨界ミセル（形成）濃度(critical micelle concentration : c.m.c.)を求める。	教科書 p5~11 を予習しておく・レポートにて疑問点を解決する.	126, 856, 857
2	希薄溶液の束一的性質	-凝固点降下-溶質が溶媒と化学反応をせず、また固溶体を形成しない場合においては、溶液の凝固温度は、純溶媒のそれよりも必ず低い。凝固点降下の測定値から溶質の分子量を求める。	教科書 p12~15 を予習しておく・レポートにて疑問点を解決する.	160
3	熱量測定	酸とアルカリを中和するときには、常に熱を発生する。熱量計を用いて強酸、強塩基の中和熱を求める。	教科書 p16~19 を予習しておく・レポートにて疑問点を解決する.	144-147
4	粘度測定	溶液の粘度は、濃度によって異なるが、特に高分子物質の溶液の粘度は濃度と共に著しく増大する。またその効果は分子の形状や分子量に強く関係する。高分子、薬剤等の粘度測定を行い、その物質の分子量を算出する。	教科書 p20~25 を予習しておく・レポートにて疑問点を解決する.	855
5	反応速度	酢酸エチルの水酸化ナトリウムによるケン化反応速度を中和滴定により測定し、速度定数を求める。更に速度定数の温度依存性より、活性化エネルギーを求める。	教科書 p26~32 を予習しておく・レポートにて疑問点を解決する.	166-171, 861
6	起電力	一つの電池の両極が同一の金属より成り、またそれらの電極が接触している液が同一の塩の溶液で、ただその濃度が違うだけであるとき、これをイオン濃淡電池と呼ぶ。この様に溶液濃度差により電池の起電力を測定する。	教科書 p33~36 を予習しておく・レポートにて疑問点を解決する.	153, 157-159, 164, 165
7	色素の吸着	色素溶液に活性炭等を入れると、液は無色または薄色になる。これは活性炭に色素が吸着されるのである。砂糖の精製、衣類の染色等の吸着現象を実験的に確かめる。	教科書 p37~39 を予習しておく・レポートにて疑問点を解決する.	856

*到達目標番号と到達目標の対応は、巻末のコアカリ SBO 番号／項目対応表を参照して下さい。

実習サポート助手：大崎 千尋